

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES (SBIm) 2006/2007

VACINAS	Do nascimento aos 2 anos de idade												Dos 3 aos 14 anos						DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	11-12 anos	14 anos	POSTOS PÚBLICOS DE VACINAÇÃO	CLÍNICAS PRIVADAS DE IMUNIZAÇÃO
BCG ID	1ª dose																		sim	sim
Hepatite B	1ª dose	2ª dose					3ª dose												sim	sim
Tríplice bacteriana (DTP ou DTPa) <sup>(1)</sup>		1ª dose		2ª dose		3ª dose					reforço			reforço					DTP	DTP e DTPa
Hemófilo B		1ª dose		2ª dose		3ª dose					reforço								sim	sim
Poliomielite (vírus inativados)		1ª dose		2ª dose		3ª dose					reforço			reforço					não	sim
Rotavírus <sup>(7)</sup>		1ª dose		2ª dose															sim	sim
Antipneumocócica conjugada heptavalente <sup>(2)</sup>		1ª dose		2ª dose		3ª dose					reforço								não	sim
Antimeningocócica C conjugada <sup>(3)</sup>			1ª dose		2ª dose						reforço								não	sim
Influenza (gripe) <sup>(4)</sup>						1ª dose	2ª dose						reforço anual						não	sim
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)						DIAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO													sim	sim
Febre amarela <sup>(5)</sup>								1ª dose											sim	não
Hepatite A									1ª dose		2ª dose								não	sim
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)									1ª dose					2ª dose					sim	sim
Varicela (catapora) <sup>(6)</sup>									1ª dose					2ª dose					não	sim
HPV <sup>(8)</sup>																	3 doses		não	sim
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa)																	reforço		não	sim

## VACINAS COMBINADAS:

**VACINA SÊXTUPLA ("HEXAVALENTE"):** o uso da vacina combinada com seis componentes – vacinas contra hepatite B, tríplice bacteriana acelular, contra infecções por hemófilos do tipo b e contra a poliomielite (com vírus inativados) – deve ser adotado sempre que possível, por causa de sua eficiência e segurança, por ser aplicada em apenas uma injeção e por ser capaz de induzir eventos adversos com menor frequência e intensidade do que se verifica quando seus componentes são aplicados isoladamente ou em associações tradicionais.

**VACINA QUÍNTUPLA ("PENTAVALENTE"):** o uso da vacina combinada com cinco componentes – vacinas tríplice bacteriana acelular, contra infecções por hemófilos do tipo b e contra a poliomielite (com vírus inativados) – deve ser adotado sempre que possível, pelos mesmos motivos citados para a vacina sêxtupla, quando não se pretende incluir na administração a vacina contra a hepatite B.